

Wachstums- und Ertragsleistung der sehr frühen Speisesorten 2014

Standort Kerpen-Buir

Pflanzdatum 25.03 2014

		10.06.2014 = 77 Wachstumstage		16.06.2014 = 83 Wachstumstage		24.06.2014 = 91 Wachstumstage		01.07.2014 = 98 Wachstumstage	
	Tage bis Auflauf	Stärke- gehalt %	Abreifenote	Stärke- gehalt %	Abreifenote	Stärke- gehalt %	Abreifenote	Stärke- gehalt %	Abreifenote
Solist	28	10,1	1,0	11,4	2,0	13,2	3,5	12,1	5,0
Suzan	31	10,1	1,0	10,9	1,0	12,3	2,0	12,5	2,0
Nandina	29	10,0	1,5	11,1	3,0	12,6	5,0	12,3	6,0
Colomba	28	9,5	1,0	10,2	1,0	11,7	4,0	11,3	6,0
Andrea	31	10,1	1,5	10,9	3,0	12,2	5,0	12,4	6,0
Glorietta	32	9,7	1,0	10,6	1,0	13,5	2,0	13,3	2,0
Sunita	31	8,8	1,0	9,1	1,0	10,7	2,0	11,0	2,5
SF Vario	30	7,7	1,0	9,5	1,0	10,1	2,0	10,7	2,5

Abreifenote: 1 = Bestand vollkommen grün
 3 = zunehmende Vergilbung der gesamten Pflanze
 5 = Stängel grün, 50% der Blätter vergilbt oder abgestorben
 7 = Stängel vergilben stärker, Blätter zu 80% abgestorben
 9 = Pflanze vollkommen abgestorben

Wachstumstage = Tage von Pflanzung bis Boniturdatum

LSV sehr frühe Speisesorten 2014

Mittel von zwei Standorten

	Sorte	Einzelwerte der Standorte		Mittelwert von zwei Standorten								
		MW.-ertrag > 30/35 mm rel.		Stärke %	Sortierung			Marktwareertrag > 35 mm				
		Buir	Kirchherten		< 30/35 mm	30/35-50	50-60/65	> 60/65 mm	dt/ha 2014	rel. 2014	rel. 2013	rel. 2012
1	Solist	88	86	11,2	1	22	60	16	564	87	86	93
2	Suzan	89	97	11,0	1	14	58	27	604	93	108	-
3	Nandina	85	92	10,5	1	18	61	20	575	89	99	94
4	Colomba	126	120	10,1	1	18	65	16	797	123	115	-
5	Andrea	94	84	10,7	1	61	34	5	576	89	-	-
6	Glorietta	100	98	11,8	1	66	30	2	639	99	-	-
7	Sunita	101	108	10,2	0	7	63	29	675	104	-	-
8	SF Vario	117	116	10,2	1	15	57	27	752	116	-	-
		100= 600 dt/ha	100= 696 dt/ha	10,7	1	28	53	18	648		100= 521 dt/ha	100= 582 dt/ha

Sortenbeschreibung LSV sehr frühe Speisesorten 2014

nach BSA Liste 2013/2011; Züchterangaben ¹⁾ und eigene Beobachtungen ²⁾

Sorte	Reifezeit	Kochtyp	Knollenform	Fleisfarbe	Anfälligkeit für:					Neigung zu:				Keimfreiheit	* Übergrößen	* Untergrößen
					Y-Virus	Krautfäule	Knollenfäule	Eisenflecken	Schorf	Ziewuchs	Hohlherzigkeit	Wachsrisse	Schwarzfleckigkeit			
1 Solist	1	vf	rundoval	hellgelb	5	6	4	3	3	3	4	3	2	4	6/6	4/4
2 Suzan	1	f	oval/lov	gelb	5	5	3	3	3	3	3	4	3	-	5/6	5/4
3 Nandina ^{1,2)}	1	vf	oval	gelb	-	5	3	5	5	3	3	3	3	3	4/5	6/5
4 Colomba ^{1,2)}	1	f	rov/oval	gelb	8	6	6	3	6	3	3	4	-	7	5/6	5/4
5 Andrea	1	f	oval/lov	gelb	-	5	3	3	3	3	3	3	-	3	3/3	7/6
6 Glorietta	1	f	lov	tiefgelb	-	5	3	3	3	4	3	3	1	3	4/5	5/4
7 Sunita	2	m	rov/oval	gelb	-	5	3	-	3	3	3	3	3	4	6/8	4/3
8 SF Vario	2	f	oval	hellgelb	1	5	3	3	3	3	3	4	4	4	6/8	4/3

f = festkochend; vf = vorwiegend festkochend;

* Frührodung/Spätrodung

1 = sehr gering, sehr niedrig

3 = gering, niedrig

5 = mittel

7 = stark, hoch